



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเบง

ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ระบบการตั้งครรภ์ที่ลื้นสุดก่อน 37 สัปดาห์ หรือที่เรียกว่า “คลอดก่อนกำหนด” ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อวัยวะสำคัญของร่างกายดังแสดงในภาพ บางรายอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อโตขึ้น



ปอดและเปลี่ยนเด็กไม่ได้
ต้องช่วยหายใจ



เส้นเลือดไปปิดหลังคลอด



เลือดออกในโพรงมดลูก



ลำไส้บวม



หัว ติดเชื้อถุงแวง

การป้องกันภัยคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

หากตั้งครรภ์พยายามดูแลรักษา
เพื่อคืนให้ความเสี่ยง



ดูแลความสะอาด
ร่างกายทุกวัน



ไม่ควรเข้าบานจากภายนอก หรือ
น้ำร้อนเดินทางเป็นระยะเวลานาน



ควรอนหลับให้เพียงพอ
และหาเวลาพักผ่อนระหว่างวัน



รับประทานอาหาร น้ำ
และยาตามคำแนะนำของแพทย์



หลีกเลี่ยงการอาบน้ำ
ในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาด



หลีกเลี่ยงการใช้ของห้าม



ควรเดินออกกำลังกาย
วันละ 30 นาที



ไม่ควรลื้นปีสสภาวะ



ไม่ควรนั่งยองๆ หรือเปลี่ยน
จากการนั่งเป็นท่านั่งบ่อยครั้ง




ควรนอนหลับให้เพียงพอ
และหาเวลาพักผ่อนระหว่างวัน

พบสัญญาณเตือน ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที

- 1 ห้อง生產 ห้องแข็ง
- 2 มีน้ำใส่ออกทางช่องคลอด
- 3 มีเลือดสีออกทางช่องคลอด
- 4 มีตกขาว/เสียว/เหลืองออกทางช่องคลอด
- 5 เป้อสภาวะแบบบ้า
- 6 หายใจลำบาก

หลีกเลี่ยง หรือมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่กระทำบริเวณหน้าท้อง



หากมีสัญญาณเตือนก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ให้เดินทางมาพบแพทย์ทันที ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดฝากครรภ์



สัญญาณเตือน การคลอดก่อนกำหนด

ช่วงเวลาที่เฝ้าระวังสำหรับการคลอด คือ อายุครรภ์ 37 – 40 สัปดาห์
การคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ถือเป็นการคลอดก่อนกำหนด

อาการเตือน การเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด

- 1 บวม และความดันโลหิตสูง
- 2 เลือดออกจากช่องคลอด
- 3 น้ำเดิน
- 4 รู้สึกว่าลูกดันน้อยกว่าปกติ
- 5 เจ็บครรภ์เป็นพักๆ

พฤติกรรมลดความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนด

- พูดแพทย์เพื่อตรวจครรภ์โดยสม่ำเสมอ
- รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- พักพ่อนให้เพียงพอ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแหน

